

UROCULTIVO – MUESTRA AL ACECHO

MATERIAL: 1 frasco estéril.

Recomendar a la persona encargada de tomarle la muestra al bebé, que el día anterior a la recolección estudie los hábitos miccionales del bebé del siguiente modo: Suministrar una mamadera. Cambiar el pañal y controlar cada 5 a 10 minutos si el pañal está húmedo. Repetir 1 ó 2 veces hasta establecer el tiempo que transcurre entre la ingestión y la micción.

RECOLECCION DE LA ORINA

Higienizar la zona genital del bebé con agua hervida tibia y jabón nuevo, tres veces, de adelante hacia atrás. Enjuagar con abundante agua hervida y secar con gasa estéril. En los varoncitos efectuar retracción del prepucio. Esperar que el bebé orine y recoger la orina en el frasco estéril, dentro de lo posible descartar las primeras gotas de orina, (preferentemente se debe tomar la muestra manteniendo al bebé de pié.) El frasco estéril deberá destaparse en el momento de tomar la muestra. Una vez recolectada la muestra, remitirla de inmediato al laboratorio, **si demora más de 30 minutos deberá conservarse en la heladera y traerla con refrigeración.**

No se aceptarán muestras de orina en bolsitas colectoras.

IMPORTANTE

La muestra deberá tomarse antes de comenzar cualquier tratamiento antibiótico.

Si el paciente ya finalizó con el tratamiento antibiótico, dejar pasar 72 hs. para la toma de la muestra, especificar el nombre del mismo y el tiempo que lo tomó.

Si el paciente está con antibióticos deberá especificar el nombre del mismo y el tiempo que lleva tomándolo.

POR FAVOR, IDENTIFIQUE EL FRASCO CON NOMBRE Y APELLIDO